

```

#setosaBivariateDistributionDisplay-x3x4.r, (C) 2014 Shojiro Tanaka
#getwd()
#objects()
#list.files()
#help(foo)

rm(list=ls(all=TRUE))

#区別のデータにする (cm単位 ; Rに予め組み込まれている)
data1 <- subset(iris, iris[, 5]=='setosa');

#平均, 分散・共分散などの計算
mean1   <- mean(data1[, 3:4])
cov1    <- cov (data1[, 3:4])
invCov1 <- solve(cov1);
denom1  <- (2*pi)^(2/2)*sqrt(det(cov1));

#2変量正規分布の計算 (0cm~10cm, 1mm毎)
r      <- matrix(0, nrow=101, ncol=101)
z1    <- matrix(0, nrow=101, ncol=101)
for(j in 0:100) {
  y <- j/10
  for(i in 0:100) {
    x <- i/10
    r <- cbind(y, x)
    z1[j, i] <- (1.0/denom1)*exp( -(1.0/2.0) *(r-mean1) %*% invCov1 %*%
t(r-mean1) )
  }
}

#3D表示
x3 <- seq(0, 10, length=101)
x4 <- x3
persp(x3, x4, z1, theta =10, phi=20, expand=0.5, col="red")

```